



インフルエンザワクチンについて



	注射タイプ（不活化ワクチン）	フルミスト（経鼻生ワクチン）
接種対象	6か月～大人まで（妊婦さん可）	2歳～18歳（妊婦さん不可）
接種回数	※6か月～12歳 2～4週間あけて2回 ※13歳以上 1回	1回 両方の鼻に1プッシュづつ噴霧 ※薬液はすぐに鼻粘膜に吸着し吸収されます。直後に鼻をかんだりくしゃみをしていても効果はおちません
	★共通 同時接種できます・ほかのワクチンとの接種間隔はあけずに接種できます	
世田谷区 助成額	★共通 世田谷区助成券対象者は6か月～18歳（高校3年生）	
	1回・2回目ともに2000円	4000円
お支払額 （現金のみ）	助成あり 1500円（1回・2回目ともに） 助成なし 3500円	助成あり 3000円 助成なし 7000円
効果	★共通 接種後約2週間で抗体ができてシーズン中（約半年）は十分な効果が期待できます	
副反応	当日、翌日の発熱 接種部位の痛み、熱感、腫れ	・1週間以内に風邪症状・発熱が30％程度の方に出現することがありますが1週間程度でおさまります ・接種後1週間はインフルエンザの迅速検査が陽性になることがあります ・接種前48時間～接種後2週間の間はタミフルなどの抗インフルエンザ薬の効果が減弱することがあります ★注意★ 接種後2週間は乳児・免疫不全の方、免疫抑制剤を使用している方との接触を避けてください
接種 できない方	★共通 ①前日・当日37.5℃以上の発熱がある ②重篤な急性期疾患にかかっている ③当院の定める予防接種見合わせ期間に当たる方	
		・ゼラチンアレルギー ・ステロイド剤（副腎皮質ホルモン剤）を内服、注射を使用している ・免疫抑制剤を服用中、日常的に免疫抑制状態にある方と接触がある
その他	★共通 インフルエンザに罹患しても別の型への感染や重症化を防ぐために接種が推奨されます 重度の卵アレルギーの方は医師に相談してください	
		★医師と相談が必要な場合は？ ・重度の鼻水・鼻づまり・鼻炎（軽症の方は接種可能です） ・重い喘息がある（発作があるときは接種できません） ・心臓血管・腎臓・肝臓・血液疾患など基礎疾患がある ・サリチル酸系医薬品（アスピリンなど）、ジクロフェナクナトリウム（ボルタレン）、メフェナム酸（ポンタール）を服用中